

# hübner® Wund- und Heil-Gel

## Silicium-Gel



# hübner

### Gebrauchsinformation:

#### Information für den Anwender

##### Silicium-Gel 5,4 g/100 ml Gel

Kieselsäure-Gel mit gefällttem, disperskolloidalem Siliciumdioxid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- » Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- » Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- » Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- » Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

- 1. Was ist hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel und wofür wird es angewendet?**
- 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel beachten?**
- 3. Wie ist hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel anzuwenden?**
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
- 5. Wie ist hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel aufzubewahren?**
- 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### 1. Was ist hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel und wofür wird es angewendet?

hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel ist ein traditionelles Arzneimittel.

Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet bei umschriebenen

lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel beachten?**

hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Siliciumdioxid oder den in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel anwenden.

##### **Kinder und Jugendliche**

Dieses Arzneimittel ist nicht für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen geeignet, da die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen nicht belegt ist.

##### **Anwendung von Silicium-Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

##### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

##### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

#### **3. Wie ist hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt: Täglich 2 – 3 mal auf die gereizten Hautbezirke auftragen und eventuell mit einem feuchten Gazestreifen überdecken. Vor Gebrauch schütteln.

Wenn Sie eine größere Menge von hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel angewendet haben, als Sie sollten:

Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von hübner® Wund- und Heil-Gel/  
Silicium-Gel vergessen haben:

Setzen Sie die Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Anwendung von hübner® Wund- und Heil-Gel/  
Silicium-Gel abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut wie z. B. Hautausschlag oder Juckreiz sind nach äußerlicher Anwendung möglich.

Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie einen Arzt, damit er über den Schweregrad und über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf das Arzneimittel nicht nochmals angewendet werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel aufzubewahren?**

Bewahren Sie dies

approved

hübner

by: Dr. Benjamin Moser date: 17.10.2024, 09:03

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG, Schloßstraße 11-17, 79238 Ehrenkirchen

Tube nach „verwendbar bis:“ bzw. „verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C lagern. Vor Frost schützen.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Nach dem Öffnen der Tube bitte im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C) und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### Was hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel enthält:

Der Wirkstoff ist: Kieselsäure-Gel mit gefällttem, disperskolloidalem Siliciumdioxid. 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 5,4 g gefällttem, disperskolloidalem Kieselsäureanhydrid (Siliciumdioxid). Der sonstige Bestandteil ist: Chlorhexidinbis (D-gluconat).

##### Wie hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel aussieht und Inhalt der Packung:

hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel ist ein weißes, homogenes, kolloidales Gel in Aluminium-Tuben.

hübner® Wund- und Heil-Gel/Silicium-Gel ist in Packungen mit 25 ml / 50 ml Gel erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

##### Pharmazeutischer Unternehmer:

**Anton Hübner GmbH & Co. KG**

Schloßstraße 11–17 • 79238 Ehrenkirchen, Germany  
[www.huebner-vital.com](http://www.huebner-vital.com)

##### Hersteller:

Anton Hübner GmbH & Co. KG • Schloßstr. 11–17 • 79238 Ehrenkirchen  
mibe GmbH Arzneimittel • Münchener Str. 15 • 06796 Brehna

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2024.**

**Die Version in dieser Packung wurde zwischenzeitlich möglicherweise aktualisiert.**

Die aktuelle Gebrauchsinformation zu diesem Arzneimittel kann durch Scannen des Data Matrix Codes oder des Barcodes auf der Arzneimittelpackung mit einem Smartphone mit Hilfe der App **GI 4.0®** abgerufen werden. Zudem finden Sie die gleichen Informationen auch unter <https://www.gebrauchsinformation4-0.de/>

Bei **GI 4.0®** handelt es sich um ein Angebot eines Diensteanbieters (Rote Liste Service GmbH).

approved

hübner

by: Jakob Faller

date: 16.10.2024, 13:40

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG, Schloßstraße 11-17, 79238 Ehrenkirchen

GI04267\_01  
Code266